

## **Odrobaczenie organizmu.**

### **Uwagi wstępne:**

- Nie wolno zrezygnować z kuracji po jej rozpoczęciu, lepiej nie zaczynać niż przerywać;
- Nie wolno zaczynać kuracji w stanie gorączki czy infekcji - należy najpierw je wyleczyć;
- Jeżeli w trakcie odrobaczania pacjent nabawi się infekcji (temperatura, poważne przeziębienie..) należy kurację przerwać, podać antybiotyk i rozpocząć całą kurację od nowa;
- Nie wolno rozpoczynać usuwania lamblii przed całkowitym usunięciem robaków obłych, (należy powtarzać nawet kilkakrotnie kurację na robaki obłe, aż zostaną całkowicie usunięte);
- Dr Wartołowska nigdy nie odstawiała innych leków, które akurat przyjmował pacjent, odstawiał je zazwyczaj po odrobaczeniu – był zdrowy;
- Odrobaczenie przeprowadza się jednocześnie u wszystkich członków rodziny

**Po podaniu pierwszej dawki może nastąpić pozorne pogorszenie stanu pacjenta, jako że przy usuwaniu dużej ilości pasożytów powstaje zwiększona ilość toksyn. Trzeba mieć tego świadomość – należy dolegliwości wyleczyć i rozpocząć kurację od początku.**

### **Kuracja:**

**I. Antybiotyk ogólnoustrojowy np. ampicylina, ospamox . przez 5 dni – celem podania jest pozbycie się z organizmu nieujawnionych jeszcze wirusów czy infekcji (w przypadku uczuleń na antybiotyki może być inny lek dający podobny skutek np. sulfonamid itd..).**

**II. Owsiki i glista - Pyrantelum wg dawek na str. 9 referatu:**

1. jednorazowo x tabletek (1 tabletki/25 kg wagi) przed śniadaniem  
10 dni przerwy
2. jednorazowo x tabletek (1 tabletki/25 kg wagi) przed śniadaniem  
10 dni przerwy
3. jednorazowo x tabletek (1 tabletki/25 kg wagi) przed śniadaniem  
10 dni przerwy
4. jednorazowo x tabletek (1 tabletki/25 kg wagi) przed śniadaniem  
10 dni przerwy

**Konieczna szczególna higiena: zmiana pościeli po kolejnych odrobaczaniach, smarowanie odbytu wazeliną , linomagiem (cel – związanie wychodzących jaj), gotowanie bielizny (ew. gorące żelazko), mycie rano i wieczorem itp..**

**III. Włosogłówka - Vermox wg dawek na str. 9 referatu (nie mniej niż 4 tabl/dzień)**

1. 2 tabl. rano i 2 tabl. wieczorem przez 3 kolejne dni

- 10 dni przerwy
2. 2 tabl. rano i 2 tabl. wieczorem przez 3 kolejne dni  
10 dni przerwy
  3. 2 tabl. rano i 2 tabl. wieczorem przez 3 kolejne dni  
10 dni przerwy
  4. 2 tabl. rano i 2 tabl. wieczorem przez 3 kolejne dni  
10 dni przerwy

**Pani doktor podawała najpierw antybiotyk przez usuwaniem lamblii, potem zaczęła podawać go wcześniej, już przed usuwaniem włosogłówki, a po jakimś czasie zaczęła podawać go na wstępie kuracji, przed usuwaniem robaków obłych.**

#### **IV. Lamblie - Furazolidon (małe dzieci) i Metronidazol (dorośli) wg dawek na str. 10 referatu:**

⇒ U niemowląt i dzieci do 2 roku życia furazolidon:

2 x 1 mała łyżeczka do roku życia

3 x 1 mała łyżeczka do 2 lat życia

4 łyżeczki dziennie do 3 roku życia

przed jedzeniem przez siedem dni, co dziesięć dni, trzy razy powtórzyć.

⇒ Starszym dzieciom metronidazol 2 x pół tabletki przed jedzeniem, co 7 dni.

⇒ Od 10 lat i dorosłym metronidazol 2 x 1 tabletki przez 7 dni – jeden dzień przerwa

W ciągu 7 dni **nifuroxazyd** 3 x 2 tabletki po jedzeniu - 2 dni przerwa.

W ciągu 7 dni metronidazol w dawkach jak wyżej – jeden dzień przerwa.

W ciągu 7 dni nifuroxazyd 2 x 2 tabletki po jedzeniu - dwa dni przerwa.

W ciągu 7 dni metronidazol w dawkach jak wyżej – jeden dzień przerwa.

W ciągu 7 dni nifuroxazyd 2 x 2 tabletki po jedzeniu

**Od ostatniego dnia trzeciej kuracji metronidazolem, co 25 dni 2 x metronidazol w ciągu 3 dni, w dawkach podawanych jako kuracja przypominająca, w czasie 6 a jeszcze lepiej 12 miesięcy.**

**NIE WOLNO NIE BRAĆ NIFUROXAZYDU !!!!**